

Hygrométrie	Milieu	Flore indicatrice nom vernaculaire	Flore indicatrice nom latin
méso-hygrophile à hygrophile	cours d'eau ↗	Callitriche des marais	<i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772
		Cornifle nageant	<i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753
		Myriophylle à feuilles alternes	<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC., 1815
		Cresson des fontaines	<i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812
méso-hygrophile à hygrophile	mare ↗	Plantain d'eau	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753
		Iris des marais	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753
		Potamot nageant	<i>Potamogeton natans</i> L., 1753
		Petite lentille d'eau	<i>Lemna minor</i> L., 1753
		Nuphar jaune	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809
		Nymphéa blanc	<i>Nymphaea alba</i> L., 1753
		Renoncule peltée	<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank, 1789
méso-hygrophile à hygrophile	roselière ↗	Roseau commun	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
		Prêle des marais	<i>Equisetum palustre</i> L., 1753
		Rubanie dressé	<i>Sparganium erectum</i> L., 1753
méso-hygrophile à hygrophile	prairie humide ↗	Jonc aggloméré	<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753
		Jonc diffus	<i>Juncus effusus</i> L., 1753
		Épilobe hirsute	<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753
		Épilobe à quatre angles	<i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753
		Fleur de coucou	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753
		Renoncule rampante	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753
		Renoncule flammette	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753
		Laïche pendante	<i>Carex pendula</i> Huds., 1762
		Laïche espacée	<i>Carex remota</i> L., 1755
		Gaillet des marais	<i>Galium palustre</i> L., 1753
mésophile	prairie à graminées ↗ pelouse ↗	Dactyle aggloméré	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753
		Flouve odorante	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753
		Fromental élevé	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
		Laïteron rude	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769
		Compagnon blanc	<i>Silene latifolia</i> Poir., 1789
		Ortie dioïque	<i>Urtica dioica</i> L., 1753
		Pâturin commun	<i>Poa trivialis</i> L., 1753
		Gaillet gratteron	<i>Galium aparine</i> L., 1753
		méso-xérophile	pelouse sèche/lande ↗
Ajonc d'Europe	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753		
Genêt à balais	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822		
Fougère aigle	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879		
Sétaire verte	<i>Setaria italica</i> subsp. <i>viridis</i> (L.) Thell., 1912		
Germandrée scorodaine	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753		
Petite centaurée commune	<i>Centaurium erythraea</i> Rafn, 1800		
Vulpie queue-de-rat	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel., 1805		
Pâturin annuel	<i>Poa annua</i> L., 1753		
Orge queue-de-rat	<i>Hordeum murinum</i> L., 1753		
méso-hygrophile à hygrophile	ripisylve ↗	Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i> L., 1753
		Frêne élevé	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753
		Aulne glutineux	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790
		Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753
		Sureau	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753
		Noisetier	<i>Corylus avellana</i> L., 1753
mésophile à méso-xérophile à méso-hygrophile	haie bocagère et boisement ↗	Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i> L., 1753
		Chataignier	<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768
		Noisetier	<i>Corylus avellana</i> L., 1753
		Merisier	<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755
		Sureau	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753
Charme	<i>Carpinus betulus</i> L., 1753		