

Le Chevreuil

Capreolus capreolus (scientifique)

Le chevreuil possède un pelage de couleur brun-roux en été et gris en hiver. Le faon est tacheté de blanc (mimétisme). Le rut a lieu du 15 juillet au 15 août et les naissances s'effectuent en mai/juin ; la portée comprend généralement 2 petits. Il vit en groupe durant l'hiver. Sa longévité est de 10 à 12 ans.

Son domaine vital varie de 20 à 50 hectares. Le Chevreuil occupe de préférence les boisements de feuillus. Il apprécie tout particulièrement les lisières (culture/forêt, jeune taillis/vieux taillis, futaie jeune...), mais il est capable de s'adapter à tous milieux (plaines céréalières, zones périurbaines, dunes,...).

Les indices de présence sur son territoire prennent plusieurs formes :

- les abrouissements : consommation des pousses terminales des essences forestières
- les frottis et les régalis : marquage territorial réalisé par les broccards (chevreuils mâles)
- les couchettes : légères dépressions où se couche le chevreuil
- les moquettes : crottes
- Les aboiements : manifestation sonore du brocard pour marquer son territoire ou son stress lors de sa fuite.

Le chevreuil est l'espèce de grande faune la plus facilement observable par tous, dans tous types de milieux.

Les axes routiers constituent des coupures de territoires qui limitent ses déplacements et entraînent de nombreux accidents.



A - Un repas de chevreuil



B - Jeunes chevreuils



C - Harde de chevrettes (femelles) et broccards (mâles)

Le chevreuil, comme tous les cervidés, est un ruminant qui cueille de façon sélective jusqu'à 1,20 m les végétaux qui ont pour lui la meilleure qualité nutritive.

Grâce à son odorat ultra-sensible, il prélève les parties les plus tendres (feuilles, bourgeons, jeunes rameaux).

En fonction des milieux et des saisons, il consomme un éventail très large d'espèces : en priorité des espèces semi-ligneuses, comme le lierre et la ronce mais aussi les glands et les faînes. En plaine, les céréales, le ray-grass, la luzerne peuvent être la base de son alimentation. L'impact du chevreuil peut être parfois important sur les peuplements sylvicoles. Les dégâts agricoles sont généralement faibles, à l'exception des dégâts sur pépinières et cultures de maraîchage de plein champ (salade, fraise...).

Au début des années 1980, les effectifs ont commencé à augmenter en Bretagne. A partir des années 1990, le chevreuil a colonisé progressivement le bocage à partir des massifs forestiers.

Par la suite, des plans de chasse appropriés et ses capacités d'adaptation lui ont permis de continuer son expansion géographique. Actuellement, il est présent partout (landes, bocages, plaines, petits et grands massifs boisés), à l'exception des îles au large des côtes bretonnes.

Le chevreuil fait preuve d'une dynamique de populations assez rapide ; les plans de chasse accordés ont pour objectif de tendre vers une stabilisation de la population.



D - Chevrette et son jeune

E - Empreinte de chevreuil

F - Faon

UNION EUROPÉENNE
UNANIEZH EUROPA



L'Europe s'engage
en Bretagne

Avec le Fonds européen agricole pour le développement rural :
l'Europe investit dans les zones rurales

plus d'infos ici

