

# Le Blaireau

*Meles meles* (scientifique)

**Le blaireau est court sur patte, avec un corps massif et ramassé, ressemblant fortement à un petit ours. Sa tête blanche est rayée de deux bandes noires caractéristiques ; sa fourrure est grisâtre. Les mises-bas s'effectuent de janvier à avril. Une portée comprend 2 à 3 petits. Sa longévité est de 4 à 5 ans.**

Son domaine vital varie de 50 à 400 ha en fonction de la densité de la population et des ressources alimentaires. Le choix de l'habitat et l'emplacement du terrier sont déterminés par la nature du sol, la structure de la végétation, la tranquillité des lieux et la proximité des ressources alimentaires.

**Le blaireau occupe de préférence les forêts de feuillus, mais s'accommode parfaitement des bosquets, et milieux semi-ouverts comme le bocage et les landes. C'est un animal nocturne qui passe sa journée au terrier et sort au crépuscule ; le retour a lieu avant le jour. Il vit en famille ou en communauté.**

Les terriers sont vastes et complexes (50 à 700 m<sup>2</sup>), dans un sol bien drainé, facile à creuser et suffisamment solide, souvent dans un endroit en pente (évacuation des déchets) et protégé par un couvert végétal lui assurant la discrétion. Il affectionne les déblais de carrière, les buses d'écoulement, le ballast de chemin de fer ou les talus routiers.

**Le blaireau est un véritable omnivore qui s'adapte aux ressources locales et saisonnières :** vers de terre (proie prédominante), petits mammifères (mulots, campagnols), escargots, limaces, insectes, amphibiens, oiseaux nichant au sol, lapereaux, charognes...mais aussi racines, bulbes, oignons, tubercules, baies, fruits forestiers (glands, fâines, châtaignes...), fruits cultivés ou sauvages (pommes, prunes, cerises...).

**Les dégâts qu'il commet sur maïs et céréales ainsi que sur les ruchers restent occasionnels.**

A - Blaireau à l'abreuvoir



B - Blaireau



C - Blaireau en vadrouille

**Même si le blaireau est l'un des mammifères les plus aisément identifiables, son activité nocturne et son mode de vie souterrain font qu'il passe souvent inaperçu. Et pourtant, le blaireau occupe l'ensemble de l'Ille-et-Vilaine.**

**L'Homme et ses activités restent les principales causes de sa mortalité.**

**Jusqu'au début des années 1990, les blaireaux ont été les victimes collatérales des opérations intensives de gazage du renard (chloropicrine), amenant dans certains secteurs les populations à un niveau critique.** Depuis, le blaireau a recolonisé progressivement son territoire d'origine. **La menace la plus sérieuse concerne l'altération importante du bocage et son cloisonnement.** Les réseaux routiers et ferroviaires occasionnent des mortalités (collision) non négligeables, principalement au printemps et à l'automne.

L'installation d'un terrier sous une infrastructure (voies ferrées, routes, digues...) nécessite souvent l'élimination complète du groupe familial pour des raisons de sécurité publique.

D - Blaireau en recherche d'un épis de maïs après récolte



E - Empreinte de Blaireau



F - Blaireau en recherche de vers

UNION EUROPÉENNE  
UNANIEZH EUROPA



L'Europe s'engage  
en Bretagne



Avec le Fonds européen agricole pour le développement rural :  
l'Europe investit dans les zones rurales



plus d'infos ici



Texte : Philippe Baudron - Fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine  
Crédits photos : Dominique Grest - Fédération Nationale des Chasseurs (A.B.C.D.F.) - Patrice Plet-Bazouges Nature (E)  
Crédits illustrations : Camilla - Bekkersara - stock.adobe.com  
Conception : UNILIC Studio graphique & Christelle Carré  
Avec le soutien de l'Union Européenne et de la Région Bretagne